


# Herkenning karperachtigen

Karperachtigen (Cyprinidae) zijn lastig uit elkaar te houden, zeker als ze nog jong zijn (<10 cm). Deze herkenningskaart helpt je bij de determinatie. Kijk altijd naar een combinatie van kenmerken: lengte en stand van de vinnen, stand van de bek, aantal schubben, aanwezigheid van bekdraden en kleuren. Maak een foto, bij voorkeur in een cuvet, dan beschadig je de vis niet. Gebruik de foto om kenmerken te controleren.




















## Kenmerken van karperachtigen:

- één rugvin
- 0-4 bekdraden
- geen vetvin of stekels op rug
- gepaarde borst- en buikvinnen

Gebruik de RAVON-gids 'Herkenning zoetwatervissen' om het onderscheid met andere families te maken.

exoot   
ingeburgerde soort 


rugvin t.o.v. anaalvin	stand bek	aantal bekdraden	aantal schubben op zijlijn	lengte max. (cm)	onderscheidend kenmerk	soort	
		0	27-32	53	rugvin hol, vinnen soms langer, lichaam oranje-geel	goudvis 	
		0	27-32	57	rugvin hol, lijkt sterk op goudvis	giebel 	
		0	33-36	46	rugvin bol	kroeskarper	
		4	33-40	108	rugvin hol	karper 	
		0	44-50	9	zijlijn kort	vetje	
		0	46-54	20	zijlijn volledig, bek klein	alver	
		0	65-76	87	zijlijn volledig, bek groot	roofblei 	
		eindstandig	0	44-54	12	zijlijn met aan weerszijden zwarte vlekjes	gestippelde alver
		0	40-50	48	schubben groter dan bij brasem, 7-9 boven zijlijn	kolblei	
		0	51-60	77	schubben kleiner dan bij kolblei, 10-13 boven zijlijn	brasem	
		0	35-38	11	donkere lengtestreep	blauwband 	
		0	40-43	48	rugvin achter buikvin	rietvoorn	
		0	32-40	9	lichaam hoog, blauwgroene streep op staart	bittervoorn	
		0	38-45	112	rugvin voor buikvin	graskarper 	
		0	42-46	59	rugvin achter buikvin, zwartomrande schubben	kopvoorn	
		0	39-48	51	rugvin gelijk met buikvin	blankvoorn	
		0	55-61	67	rugvin achter buikvin	winde	
		0	41-54	5	kop stomp, zijlijn kort	dikkopelrits 	
		0	80-110	12	rugvin achter buikvin, flanken met donkere vlekken	elrits	
		2	95-100	65	lichaam bruin, kieuwdeksel groen glanzend	zeelt	
		0	48-55	32	bek licht onderstandig, oog met gele vlek	serpeling	
		0	56-61	57	dopneusje	sneep	
2		39-43	19	schubben achter op kop gekield, vinnen ongevekt	witvinriviergrondel 		
2		40-45	19	schubben achter op kop ongekield, vinnen gevekt	riviergrondel		
		4	55-65	94	afgeplatte kop met spitse snuit, lichaam gevekt	barbeel	




**rugvin lang**

eindstandige bek

lichaam oranje geel, maar kleur kan in wild verdwijnen




**goudvis**




**giebel**

juvenielen (<5cm) met donkere vlek op staartwortel



**kroeskarper**




**karper**




**anaalvin lang**


bovenstandige bek




**vetje**




**alver**



**roofblei**




**kolblei**



**brasem**



**blauwneus**



**Donaubrasem**



**gestippelde alver**


onderstandige bek

eindstandige bek



**rug- en anaalvin gelijke lengte**


bovenstandige bek



**blauwband**




**rietvoorn**




**bittervoorn**

eindstandige bek




**graskarper**




**kopvoorn**




**blankvoorn**



**winde**




**dikkelirits**



**elrits**



**zeelt**




**serpeling**




**sneep**

onderstandige bek



**witvinriviergrondel**



**riviergrondel**



**barbeel**

onderstandige bek

**Samenstelling:** Frank Spikmans & Jelger Herder, **Foto's:** Jelger Herder, **Vormgeving:** RAVON, **Tekeningen:** Paul Veenfliet

Deze herkenningskaart is mede mogelijk gemaakt door het Team Invasieve Exoten van de NVWA.



RAVON  
www.ravon.nl



**RAVON**